



《2026/27 季節性流感疫苗學校外展計劃 - 注射式滅活流感疫苗供應》

各位家長：


本校已參加衛生署推行的「2026/27 季節性流感疫苗學校外展計劃」。衛生署委派的「莊柏醫療團隊」將於 2026 年 11 月 13 日（星期五）到校，為已同意接種的學生接種 Vaxigrip (HK-68672)（賽諾菲三價滅活流感疫苗）。

隨附相關資料供家長參考。若對疫苗計劃有任何疑問，歡迎於辦公時間內聯絡項目管理及疫苗計劃科。辦公時間：星期一至五上午 9 時至下午 5 時 30 分（星期六、日及公眾假期休息）。

請家長於 10 月 23 日或前簽署此電子通告。如有任何查詢，歡迎致電 2471 2622 與黃綺敏主任聯絡。


伯特利中學署任校長

二零二六年十月十六日



# 疫苗資料頁

查詢：  
項目管理及疫苗計劃科  
電話：2125 2125  
傳真：2713 9576  
電郵：vacs@dh.gov.hk  
辦公時間：星期一至五上午 9 時至下午 5 時 30 分，星期六、日及公眾假期休息



| TetrAnflu<br>(四價滅活流感疫苗 - 科興) |                                                                                                                                                                                                                            | Vaxigrip<br>(三價滅活流感疫苗 - 賽諾菲)                                                                                                                             | FluMist<br>(三價滅活流感疫苗 - 阿斯利康)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年齡及劑量                        | 成人及 3 歲及以上之兒童可接種 0.5 毫升疫苗一劑                                                                                                                                                                                                | 6 個月至 17 歲兒童：0.5 毫升疫苗一劑<br>成人：0.5 毫升疫苗一劑                                                                                                                 | 適用於 2 至 49 歲的人。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 接種方法                         | 於上臂三角肌進行肌肉注射                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>首選的注射方法為肌肉注射。</li> <li>出血病症患者或服用抗凝血劑的人士，應請教醫生，考慮作皮下注射。</li> </ul>                                                 | FluMist 是一款鼻噴劑。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 不宜接種人士                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>對雞蛋或任何疫苗成分，包括輔料、甲醛、Triton X-100 及慶大霉素敏感的人士。</li> <li>患有急性疾病、嚴重慢性疾病<sup>1</sup>、慢性疾病的急性發作、感冒及發燒的人士。</li> <li>患有未控制的癲癇或其他進行性神經系統疾病，及吉·巴氏綜合症的人士。</li> <li>出血病症患者或服用抗凝血劑的人士。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>對其活性成分、任何輔料或任何或會作為殘留物存在的成分例如雞蛋（卵清蛋白、雞肉蛋白）、新霉素、甲醛和 octoxinol-9 有過敏反應的人士。</li> <li>如接種當日發燒，可延遲至病癒後才接種疫苗。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>對任何疫苗成分或接種任何流感疫苗後曾出現嚴重過敏反應；</li> <li>正服用阿士匹靈或含水楊酸鹽藥物的兒童和青少年；</li> <li>患有哮喘或在過去 12 個月內曾患上喘鳴的兩歲至四歲兒童；</li> <li>因任何原因導致免疫功能減弱的兒童及成人；</li> <li>免疫系統嚴重受抑制而需在受保護的環境下接受護理的人士之緊密接觸者和照顧者；</li> <li>懷孕；</li> <li>及在過去 48 小時曾服用流感抗病毒藥物。</li> </ul> <p>如接種當日發燒，可延遲至病癒後才接種疫苗。</p> |
| 孕婦及哺乳期                       | <p>目前尚未獲得孕婦及哺乳期婦女使用此產品的臨床試驗數據。</p> <p>若此人群需使用此產品，建議與醫生共同進行效益風險評估後決定。</p>                                                                                                                                                   | <p>Vaxigrip 可以在懷孕時任何期間接種。</p> <p>Vaxigrip 或可在哺乳期接種。</p>                                                                                                  | <p>孕婦不宜接種</p> <p>如正哺乳，請諮詢您的醫生。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |

備註  
以上資料僅供參考，如有任何疑問，請諮詢您的醫生。  
如欲獲取更多資料，請瀏覽衛生署衛生防護中心網頁 <https://www.chp.gov.hk/tc/features/100764.html>



Version 20250919

<sup>1</sup> 嚴重慢性疾病是指施用治療後仍無法醫治或控制有關的慢性疾病，或病情狀況已超出醫護人員認為安全或適當的臨床參數範圍。